

Kreuzbandriss

Die Kreuzbänder sind für die normale Bewegung und der Belastung der Hintergliedmaße von großer Bedeutung.

Die Zerreißung des vorderen Kreuzbandes ist die häufigste Bandruptur des Hundes. Die Ursache ist noch nicht ganz geklärt. Eine degenerative Veränderung des vorderen Kreuzbandes verursacht bereits eine Bandschwächung, so dass es nur noch ein geringes Trauma zur kompletten Ruptur bedarf.

Die meisten Kreuzbandrupturen entstehen durch:

- Degenerative Ursachen
- Übergewicht
- Gliedmaßenstellung
- Alter

Symptome:

In akuten Fällen:

- Plötzlich beginnende Lahmheit (teilweise wird die betroffene Gliedmaße nicht mehr belastet)
- Gelenkschwellung
- Schmerzen

In chronischen Fällen:

- Länger andauernde Lahmheit
- Probleme beim Aufstehen
- Typische Sitzposition- betroffene Bein wird vom Körper weggestreckt
- Muskelatrophie

Physiotherapie nach chirurgischen Eingriffen/ konservative Therapie:

- Schmerzlinderung
- Muskelentspannung
- Muskelkräftigung
- Ausdauer- u. Konditionsaufbau